

Nombre: Carbocisteína Condición de venta: sin receta médica Clasificación: Mucolítico Disponible en:	Nombres de marca:
---	--------------------------

Lea cuidadosamente este folleto antes de la administración de este medicamento.

Contiene información importante acerca de su tratamiento. Si tiene cualquier duda o no está segura de algo pregunte a su médico o farmacéutico. Guarde este folleto puede necesitar leerlo nuevamente

- **Composición y presentación:**
- **Principio Activo:**
- **Excipiente**

1.- ¿Para qué se usa?

Este medicamento es usado en el alivio de la tos producida en estados gripales. No debe utilizarse para el alivio de la tos crónica ocasionada por el cigarrillo, asma, enfisema o en tos seca.

2.- Administración (oral)

- Rango y frecuencia

Dosis adultos y niños mayores de 12 años: 250mg 3 veces al día.

Niños mayores de 6 años: 100mg 3 veces al día.

Niños menores de 6 años: 50mg 3 veces al día.

- Consejo de cómo administrarlo

- Jarabe

Debe administrarlo con la cuchara de dosificación que adjunte el envase, de lo contrario lo más recomendable es que utilice una jeringa, sin aguja, (limpia, sin uso previo) para administrar la dosis exacta, posteriormente tome un vaso de agua u otra bebida.

Los comprimidos puede tomarlos con un vaso de agua.

- Uso prolongado

Si persiste o se intensifica la tos después de 7 días de tratamiento consulte con su médico, ya que se puede estar ocultando una enfermedad severa, que requiera de otro medicamento diferente.

3.- Precauciones

- Embarazo

Este medicamento puede causar daño al **feto**, usted debe consultar al médico, antes de usar este medicamento si está embarazada.

- Lactancia

Este medicamento podría pasar a la leche materna, por lo que debe discutir con su médico la conveniencia de usar este medicamento.

- Lactantes y niños

El uso de este medicamento en niños debe ser previa consulta a su pediatra.

No se recomienda utilizar en niños menores de 1 año.

4. - Usted no debe tomar este medicamento en los siguientes casos:

Si ha presentado síntomas de alergia al medicamento.

Si ha presentado alergia a alguno de los excipientes de la formulación.

Si se encuentra embarazada o en periodo de lactancia.

No debe utilizarlo para el alivio de la tos crónica ocasionada por el cigarrillo, **asma**, **enfisema** o en toses secas.

Si usted padece de **ulcera péptica** activa.

5. - Interacciones

- Medicamentos

Usted debe consultar con el farmacéutico la conveniencia de usar este medicamento, si está tomando otros, particularmente otros medicamentos para aliviar la tos.

- Enfermedades

Usted debe consultar a su médico, antes de tomar cualquier medicamento si presenta una enfermedad al hígado, riñón, **cardiovascular** o cualquier otra enfermedad crónica y severa.

En el caso particular de este medicamento, si ha presentado **asma** bronquial, insuficiencia respiratoria y antecedentes de **úlceras gástricas o duodenales**.

6. - Efectos adversos

Existen efectos que se presentan rara vez, pero son severos y en caso de presentarse debe acudir en forma inmediata al médico: náuseas, diarrea, dolor de cabeza, **dispepsia**, **erupción** cutánea, insomnio, palpitaciones, **hipoglucemia**.

- Otros efectos

Pueden presentarse otros efectos que habitualmente no necesitan atención médica, los cuales pueden desaparecer durante el tratamiento, a medida que su cuerpo se adapta al medicamento. Sin embargo consulte a su médico si cualquiera de estos efectos persisten o se intensifican: : náuseas, diarrea leve, **vértigo**, dolor de cabeza leve.

7. - Sobredosis

Los síntomas de sobredosis corresponden a una intensificación de los efectos adversos descritos, tales como: **epigastralgia**, náuseas, vómitos y diarreas. Debe recurrir a un centro asistencial para evaluar la gravedad de la **intoxicación** y tratarla adecuadamente, llevando el envase del medicamento que se ha tomado.

8. - Condiciones de almacenamiento:

Mantener lejos del alcance de los niños, mantener en su envase original, protegido del calor luz y humedad a temperaturas inferiores a los 30°C.

No usar este producto después de la fecha de vencimiento indicada en el envase.

No repita el tratamiento sin consultar antes con el médico

No recomiende este medicamento a otra persona.

