

<b>Nombre:</b> Paracetamol (Acetaminofeno) <b>Condición de venta:</b> Venta directa <b>Clasificación:</b> Analgésico, Antipirético <b>Disponible en:</b>	<b>Nombres de marca:</b>
---	--------------------------

Lea cuidadosamente este folleto antes de la administración de este medicamento. Contiene información importante acerca de su tratamiento. Si tiene cualquier duda o no está segura de algo pregunte a su médico o farmacéutico. Guarde este folleto, puede necesitar leerlo nuevamente.

**Composición y presentación:**

**Principio activo:** Paracetamol (Acetaminofeno)

**Excipientes:** se deben detallar, según última fórmula aprobada en el registro

**1. - ¿Para qué se usa?**

Este medicamento se usa para el alivio temporal de dolores leves a moderados como dolor de cabeza, muelas, musculares y para bajar la fiebre.

**2. - Administración y dosis**

Este medicamento se administra por vía oral, con un vaso de agua, 30 minutos antes o 2 horas después de las comidas.

Adultos y adolescentes: 325 a 650mg 3 a 5 veces al día, hasta un máximo de 6 veces, con un intervalo mínimo entre dosis de 4 horas. **No administrar más de 4 g diarios**

Niños hasta 12 años: Las dosis pediátricas de paracetamol (acetaminofeno) se deben ajustar según el peso del niño y de acuerdo a la indicación del médico. A continuación se adjunta una tabla representativa de la dosificación pediátrica del medicamento:

EDAD (AÑOS)	PESO(KG)	DOSIS(MG) CADA 6 A 8 HORAS	DOSIS (UNIDAD DE MEDIDA) FORMAS LÍQUIDAS	DOSIS MAXIMA DIARIA(MG)
2-3	11-16	160mg	señalar el volumen a tomar o cantidad de gotas a administrar	750
4-5	16-22	240	señalar el volumen a tomar o cantidad de gotas a administrar	1200
6-8	22- 27	320	señalar el volumen a tomar o cantidad de gotas a administrar	1650
9-10	27-32	400	señalar el volumen a tomar o cantidad de gotas a administrar	2000
11-12	32-44	480	señalar el volumen a tomar o cantidad de gotas a administrar	2500

La dosis se puede administrar 3 a 5 veces al día. No se recomienda administrar más de 5 dosis al día a niños menores de 12 años, a menos que el médico lo señale.

No se debe exceder la dosis máxima diaria y se debe mantener un intervalo mínimo de 4 horas entre dosis. En los niños menores de 2 años, la posología la debe señalar el médico

### 3. - Advertencias:

No administrar por más de 5 días en caso de dolor sin fiebre, por más de 3 días en caso de fiebre o por más de 2 días en caso de dolor de garganta, sin consultar antes con el médico.

**El uso prolongado y la administración de altas dosis de paracetamol pueden provocar daño hepático severo.**

### 4. - Precauciones

- *Consumo de alcohol:* Se debe evitar consumir alcohol, la combinación de éste con paracetamol puede provocar serios problemas al hígado.
- *Embarazo:* No se han demostrado mayores efectos adversos durante el embarazo, pero el medicamento debe ser indicado por su médico
- *Lactancia:* Aunque paracetamol pasa a la leche en pequeñas cantidades, no se han registrado problemas en lactantes cuya madre está usando paracetamol. De cualquier modo, consulte con su médico la conveniencia de tomar este medicamento si está amamantando.
- *Uso en niños:* El uso de este medicamento en niños debe hacerse, previa consulta a su pediatra.
- *Precauciones especiales:* Algunos preparados pueden llevar como endulzante aspartamo, en tal caso debe tener precaución si padece de fenilcetonuria.
- *Enfermedades*  
Usted debe consultar a su médico, antes de tomar cualquier medicamento si presenta una enfermedad al hígado, riñón, corazón o cualquier otra enfermedad crónica y severa. En el caso particular de este medicamento, debe consultar con su médico si padece de diabetes mellitus, fenilcetonuria, o un historial de abuso de alcohol.

### 5. - Usted no debe tomar este medicamento en los siguientes casos:

Si ha ingerido alcohol, si tiene algún tipo de daño hepático o si usted ha presentado síntomas de alergia al acetaminofeno, o a alguno de los excipientes contenidos en el producto.

Usted deberá suspender el medicamento y consultar al médico en las siguientes condiciones:

- Si los síntomas no mejoran
- Si aparecen otros síntomas
- Si el dolor o la fiebre no mejoran o empeoran
- Si junto con el dolor de garganta presenta dolor de cabeza, manchas en la piel, náuseas o vómitos.

### 6. - Interacciones

#### - Medicamentos

Usted debe consultar con el farmacéutico la conveniencia de usar este medicamento, si está tomando otros, particularmente anticoagulantes (como warfarina), ácido acetilsalicílico (aspirina), cualquier antiinflamatorio no esterooidal, fenobarbital, carbamazepina, fenitoína, sulfapirazonas, isoniazida, nicotina, o zidovudina. Se recomienda

precaución en pacientes asmáticos, sensibles al ácido acetilsalicílico, debido a que se han descrito ligeras reacciones broncoespásticas con paracetamol (reacción cruzada).

#### **7. - Efectos adversos**

- *Existen efectos que se presentan rara vez, pero son severos y en caso de ocurrir debe acudir en forma inmediata al médico:*

Reacción alérgica al paracetamol, que se presenta con rash, picazón, hinchazón, o dificultad para respirar; piel y ojos de color amarillo (indican daño hepático), dolor de garganta y fiebre (que no se han presentado antes del tratamiento, y que no responden a causas de la condición que se está tratando), hemorragias o moretones sin razón aparente, sangre en la orina, dolor, menor o mayor frecuencia al orinar.

- *Otros efectos*

Pueden presentarse otros efectos que habitualmente no necesitan atención médica, los cuales pueden desaparecer durante el tratamiento, a medida que su cuerpo se adapta al medicamento. Sin embargo consulte a su médico si cualquiera de estos efectos persiste o se intensifica: fatiga o debilidad.

Este medicamento usado en forma crónica o en dosis muy elevadas puede provocar severo daño al hígado, por lo que no se recomienda usarlo en forma prolongada sin previa consulta a su médico.

#### **8. - Sobredosis**

Los síntomas de sobredosis corresponden a una intensificación de los efectos adversos descritos, tales como: diarrea, pérdida del apetito, náuseas o vómitos, calambres o dolor estomacal, desmayos. Debe recurrir a un centro asistencial para evaluar la gravedad de la intoxicación y tratarla adecuadamente, llevando el envase del medicamento que se ha tomado.

#### **9. - Condiciones de almacenamiento:**

Mantener lejos del alcance de los niños, mantener en su envase original, protegido del calor luz y humedad a temperaturas inferiores a los 25°C.

No usar este producto después de la fecha de vencimiento indicada en el envase.

**No repita el tratamiento sin consultar antes con el médico**

No recomiende este medicamento a otra persona.